Inducción a la Remisión (≤ 65 años no "unfit")

Protocolo PETHEMA LMA 10 para menores de 65 años

Enviar 1 semana tras la induccion (Fax: +34 96 1246201; E-mail: montesinos_pau@gva.es)

Pulsar la tecla Tab para pasar de un campo a otro. Marcar la(s) opción(es) correcta(s) con un clic en los campos ☐

Identificación del Paciente		
Hospital:	Iniciales paciente (Nombre, Apellidos):	
Fecha de diagnóstico:	Nº de historia:	Nº de registro:

Inducción (3+7)

Fecha de inicio del 3+7: **Modificación de dosis:** Idarubicina: No ☐ Sí ☐ Ara-C: No ☐ Sí ☐

Describir modificación de dosis:

Toxicidad Hematológica

Fechas de recuperación hematopoyética:

Neutrófilos >0,5 x 10^9/L: Neutrófilos >1 x 10^9/L: Si no neutropenia, poner fecha de inicio de inducción

Plaquetas >50 x 10^9/L: Plaquetas >100 x 10^9/L: Si no trombopenia, poner fecha de inicio de inducción

Respuesta al Primer Ciclo de Inducción (3+7)

(ver criterios en página 2 del formulario)

Tipo de respuesta: Resistencia ☐ Remisión parcial ☐ Remisión completa (RC) ☐ RCi ☐ Muerte en inducción ☐

Si muerte, fecha de muerte: Causa(s) de muerte:

Fecha de evaluación: Blastos en MO (%) Blastos en SP (%)

EMR en MO tras inducción: Realizada No ☐ Sí ☐ Resultado: Alta ☐ Baja ☐ EMR en celularidad total (%)

Administración de quimioterapia de segunda línea: No ☐ Sí ☐ Describir:

Administración de segunda ciclo idéntico de quimioterapia 3+7: No ☐ Sí ☐ ***Completar la sección de abajo***

Segundo ciclo de Inducción (3+7)

Fecha de inicio ciclo 2: **Modificación de dosis:** Idarubicina: No ☐ Sí ☐ Ara-C: No ☐ Sí ☐

Describir modificación de dosis:

Toxicidad Hematológica

Fechas de recuperación hematopoyética:

Neutrófilos >0,5 x 10^9/L: Neutrófilos >1 x 10^9/L: Si no neutropenia, poner fecha de inicio de inducción

Plaquetas >50 x 10^9/L: Plaquetas >100 x 10^9/L: Si no trombopenia, poner fecha de inicio de inducción

Respuesta al Segundo Ciclo de Inducción (3+7)

(ver criterios en página 2 del formulario)

Tipo de respuesta: Resistencia ☐ Remisión parcial ☐ Remisión completa (RC) ☐ RCi ☐ Muerte en inducción ☐

Si muerte, fecha de muerte: Causa(s) de muerte:

Fecha de evaluación: Blastos en MO (%) Blastos en SP (%)

EMR en MO tras ciclo 2: Realizada No ☐ Sí ☐ Resultado: Alta ☐ Baja ☐ EMR en celularidad total (%)

Si RP o resistencia tras ciclo 2, administración de quimioterapia de rescate: No ☐ Sí ☐ Describir:

Comentarios

Criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción			
Tipo de respuesta	**Aspirado de médula ósea**	**Recuentos en sangre periférica**	**Otros criterios**
Remisión completa (RC)	Valorable, < 5% blastos	PMN > 1 x 10^9/L Plaquetas >100 x 10^9/L Ausencia de blastos leucémicos	--
RC sin recuperación (RCi)	Valorable, < 5% blastos	PMN < 1 x 10^9/L y/o Plaquetas < 100 x 10^9/L Ausencia de blastos leucémicos	--
Remisión parcial (RP)	Valorable, Entre 5 y 25% blastos con disminución > 50% respecto al diagnóstico	Ausencia de blastos leucémicos (*)	--
Resistencia absoluta	Valorable, > 25% blastos y/o reducción de blastos < 50% respecto al diagnóstico	--	--
Muerte en inducción	--	--	Muerte sin objetivarse previamente RP o resistencia

(*) En general se requiere recuperación hemoperiférica (PMN >1000 x 10^9/L y Plaquetas >100 x 10^9/L), pero se acepta clasificar la respuesta como RP sin objetivarse recuperación de recuentos en SP