Recomendaciones PETHEMA 2014 LMA ≥ 65 años

Diagnóstico morfológico de LMA (no LPA)

↓

Ciclo 1 (FLUGA)

G-CSF 5 µgr/kg/día, SC días 1 a 3
(solo día 1 si leucocitos >10 x 10^9/L, no dar si >25 x 10^9/L)
Ara-C 75 mg/m²/d SC o IV, los días 2 a 5
(IV si hospitalizado)
Fludarabina 40 mg/m²/d VO o 25 mg/m²/d IV, los días 2 a 6
(IV si hospitalizado) (días 2 a 5 si edad > 75 años)

↓

Cualquier respuesta

ECOG 0-1 y cariotipo CBF o normal y edad <71 años

↓

Ciclo 2 (3+7)

Ida 8 mg/m²
Ara-C 100 mg/m²

↓

RC o RCi

↓

Ciclo 3 (FLUGA)

↓

Recolección PH → **No**

↓

Auto-TPH (BEA)

Ciclo 4 (3+7)

Ida 8 mg/m²
Ara-C 100 mg/m²

RP/Resistencia → **Ciclo 3 (FLUGA)**

ECOG 2-3 → **Mantenimiento (Mini-FLUGA)**

Resto de pacientes

↓

Ciclo 2 (FLUGA)

↓

RC, RCi o RP

↓

Ciclo 3 (FLUGA)

↓

RC o RCi

↓

Mantenimiento (Mini-FLUGA)
(6 ciclos mensuales)

Ara-C 75 mg/m²/d SC, los días 1 y 2
Fludarabina 40 mg/m²/d VO, los días 1 y 2

Ciclo 2 (FLUGA) → ***Resistencia*** **Considerar Ciclo 3**

Ciclo 3 (FLUGA) → ***Resistencia*** **Sale de protocolo**